CORRIGÉ DU SUJET HEC MATHS 1 ECS 2016

Mon compte | Mes cours | Mes exercices | Mes QCM

Mes parcours pour réussir en maths

- Je révise en autonomie
- Je progresse avec un coach
- Je révise pour des années corrigées

Je cherche un prof de maths !

Aide Soutien Prépa
★★★★★ 4.7/5 (+)

Partie I. Partitions de l'identité

Q.1.a Il est aisé de trouver trois triangles dont aucun sommet n'appartient à la droite (D) :

$$\left\{A,B,C\right\} \subset \left\{\left(\begin{array}{c}1\\0\\0\end{array}\right),\left(\begin{array}{c}0\\1\\0\end{array}\right),\left(\begin{array}{c}0\\0\\1\end{array}\right)\right\}$$

Il existe cinq autres triplets de cette nature non-plus prendre les lettres $\left(\begin{array}{c}1\\1\\1\end{array}\right)$:

Dans ces trois triplets les trois angles $\widehat{Abc}$, $\widehat{Bca}$ et $\widehat{Cab}$ valent $\frac{\pi}{2}$: $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \frac{\pi}{2}$ $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \frac{\pi}{2}$.

$A = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ $C = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ $\left(\begin{array}{c}1\\1\\1\end{array}\right)$ $\left(\begin{array}{c}1\\1\\1\end{array}\right)$ $\left(\begin{array}{c}1\\1\\1\end{array}\right)$ $\left(\begin{array}{c}1\\1\\1\end{array}\right)$ $\left(\begin{array}{c}1\\1\\1\end{array}\right)$ $\left(\begin{array}{c}1\\1\\1\end{array}\right)$

$A \in (D)$, $B \in (D)$, $C \in (D)$ et aucun sommet n'appartient à la droite (D) : $\alpha = \widehat{Abc} + \widehat{Bca} + \widehat{Cab} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}$.

donc $\widehat{Abc} + \widehat{Bca} + \widehat{Cab} = \widehat{Abc} + \widehat{Bca} + \widehat{Cab} = \frac{\pi}{2}$ donc

$$\boxed{\text{Il n'est pas disponible}}$$

Q.1.b Après quelques ajustements : $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ $C = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ $\left(\begin{array}{c}1\\1\\1\end{array}\right)$ $\left(\begin{array}{c}1\\1\\1\end{array}\right)$ $\left(\begin{array}{c}1\\1\\1\end{array}\right)$ $\left(\begin{array}{c}1\\1\\1\end{array}\right)$ $\left(\begin{array}{c}1\\1\\1\end{array}\right)$ $\left(\begin{array}{c}1\\1\\1\end{array}\right)$ donc

$$\boxed{A \in \mathcal{P} \text{ et } \mathcal{P} \text{ est la partition associée de } A}$$

Q.1.c Supposons que le triplet α existe alors $\mathcal{P}$ de type $\left(\begin{array}{c}1\\1\\1\end{array}\right)$ donc

$$\boxed{\text{Il n'est pas disponible, donc}}$$

Q.1.d Il est disponible, donc

$$\boxed{\mathcal{P} = \left(\begin{array}{c}1\\1\\1\end{array}\right)}$$

Pour la suite de la question, on pose $\left(\begin{array}{c}1\\1\\1\end{array}\right) = \left(\begin{array}{ccc}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{array}\right)$.

Soit $\alpha \in \mathcal{L}$ donc $\left(\begin{array}{c}1\\1\\1\end{array}\right) \in \left(\begin{array}{c}1\\1\\1\end{array}\right)$ $\left(\begin{array}{c}1\\1\\1\end{array}\right)$ $\left(\begin{array}{c}1\\1\\1\end{array}\right)$ $\left(\begin{array}{c}1\\1\\1\end{array}\right)$ $\left(\begin{array}{c}1\\1\\1\end{array}\right)$ $\left(\begin{array}{c}1\\1\\1\end{array}\right)$ donc

$$\boxed{\text{Il est aisé de trouver trois triangles dont aucun sommet n'appartient à la droite } (D) \text{ : } \alpha = \widehat{Abc} + \widehat{Bca} + \widehat{Cab} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}.}$$

donc $\left(\begin{array}{c}1\\1\\1\end{array}\right) \in \left(\begin{array}{c}1\\1\\1\end{array}\right)$ $\left(\begin{array}{c}1\\1\\1\end{array}\right)$ $\left(\begin{array}{c}1\\1\\1\end{array}\right)$ $\left(\begin{array}{c}1\\1\\1\end{array}\right)$ $\left(\begin{array}{c}1\\1\\1\end{array}\right)$ $\left(\begin{array}{c}1\\1\\1\end{array}\right)$ donc

$$\boxed{\text{Il est aisé de trouver trois triangles dont aucun sommet n'appartient à la droite } (D) \text{ : } \alpha = \widehat{Abc} + \widehat{Bca} + \widehat{Cab} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}.}$$

Q.2.a Il est aisé de trouver $\left(\begin{array}{c}1\\1\\1\end{array}\right)$

$$\boxed{M^T = M}$$

(iii) On pose $U = X - M^T$.

On a d'après (i) que M et M^T sont des inverses de Penrose-Moore.

$MU = M^2X - M^TM^2 = M - M = 0$. Donc $MU = 0$, donc d'après (ii), $M^T = 0$.

Donc $MX = M$ et $M^TX^T = M^T$.

De plus, en repassant le même type de calculs qu'en (i),

$M = M\underbrace{XM}_{=M} = M^T(XM)^T = M^TM^TX = M^TX$ car X est symétrique.

Et on prouve $U^T = (X - M^T)^T = X - M$ qui prouve le même que ci-dessus. Donc $U^T = M^T - M$.

Donc $\sum_{i=1}^n M^TX_i^TX_i = \sum_{i=1}^n (M^T - M)^TX_i = \sum_{i=1}^n (M^T - M)^T = \sum_{i=1}^n M^T - M$

Donc $\sum_{i=1}^n M^T - M^T = \sum_{i=1}^n M^T$ Donc

$$\boxed{N = M^T}$$

Donc si X est une inverse de Penrose-Moore de M, alors X est unique et $X = M^T$.

On a montré au si que M^T était une inverse de Penrose-Moore de M.

Donc

$$\boxed{M^T \text{ est l'unique inverse de Penrose-Moore de } M}$$

5 Je résultat préliminaire : soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$.

On a $\mathrm{Im}(AB) \subset \mathrm{Im}(A)$, donc $\mathrm{rg}(AB) \leq \mathrm{rg}(A)$.

Une matrice et sa transposée ayant même rang, on a

$\mathrm{rg}(AB) = \mathrm{rg}\left({}^t(AB)\right) = \mathrm{rg}\left({}^tB\,{}^tA\right) \leq \mathrm{rg}\left({}^tB\right) = \mathrm{rg}(B)$.

Donc $\mathrm{rg}(AB) \leq \min(\mathrm{rg}(A), \mathrm{rg}(B))$.

b) $P = \underbrace{\frac{1}{\|X\|^2}}_{\in\mathbb{R}} \underbrace{{}^tX\,X}_{\in\mathcal{M}_1(\mathbb{R})}$. Donc $Y^2P = Y$ donc $Y^2P - Y = 0$ donc $Y(YP - I) = 0$ par définition de $(Y\,P)^2$ au début de (1).

Donc $Y\,P\,Y = Y$. Donc $\mathrm{rg}\left(Y\,P\,Y\right) = \mathrm{rg}\left(Y\right)$. $\mathrm{rg}\left(Y\right)$ d'après 1d,d, donc $\mathrm{rg}\left(Y\,P\,Y\right) = \mathrm{rg}\left(Y\right)$.

De plus, d'après le résultat préliminaire, $\mathrm{rg}\left(Y\,P\,Y\right) \leq \mathrm{rg}\left(P\right)$ $\mathrm{rg}\left(Y\,P\right)$.

Donc $\mathrm{rg}\left(P\right) \leq \mathrm{rg}\left(P\right)$.

Donc

$$\boxed{\mathrm{rg}\left(P\right) = \mathrm{rg}\left(P\right)}$$

b) Il s'utilisera les propriétés des $\left(Y^T\right)^{-1}$ on montre que $P^T = P$ et que $P^2 = P$, donc que P est la matrice d'un projecteur orthogonal sur Im noté p.

D'après 1d,c,f pour $x \in F$: Donc $X\,X = X$. Donc $P\,X = X$, donc $P \circ X = X$.

Or $\dim\left(F^\perp\right) = n - \dim\left(F\right) = n - \mathrm{rg}\left(X\right) = n - \mathrm{rg}\left(P\right) = \dim\left(\mathrm{Im}\,(p)\right)$. Donc $F^\perp = \mathrm{Im}\,(p)$.

$$\boxed{p \text{ est le projecteur orthogonal sur } F.}$$

c) Je cible que $\mathrm{rg}\left(S\right) = \mathrm{rg}\left(Y\,S\right)$. Or $Y\,S = X$, $\mathrm{rg}\left(X\right)$ n S $\mathrm{rg}\left(S\right)$ par transitivité, donc $\mathrm{rg}\left(Y\,S\right) \leq \mathrm{rg}\left(S\right)$. $\mathrm{rg}\left(S\right) \leq \mathrm{Im}\,(A_1, \ldots, A_n)$ est une famille libre.

Comme $a_i \neq 0$, $\exists\, k \in \mathbb{R}$ / $a_i = k\,e_i$, donc

$$\boxed{\mathrm{M}\left(\mathbb{R}\,/\,\mathbb{R}\right) \ni \left(\mathrm{Im}\,(A_1, \ldots, A_n = k\,e_{k_1}\right)}$$

b) On a :

$$\begin{aligned}
{}^tS\,S &= \begin{pmatrix} m_1 & m_{k_1} \\ \vdots & \vdots \\ m_n & m_{k_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_1 & m_{k_1} \\ \vdots & \vdots \\ m_n & m_{k_n} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} m_1^2 & \cdots & m_1\,m_{k_1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ m_1\,m_{k_1} & \cdots & m_{k_1}^2 \end{pmatrix} \\
&= \underbrace{\left(m_1^2 + \cdots + m_{k_1}^2\right)}_{\in\mathbb{R}} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\in\mathcal{M}_2(\mathbb{R})}
\end{aligned}$$

Les deux colonnes de S sont proportionnelles, donc S n'est pas inversible. Or S est un vecteur propre de M. Un vecteur propre associé en λ est, par exemple, $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

M est symétrique réelle, donc diagonalisable dans une base orthonormée de vecteurs propres et λ existe $\mathbb{C}$ qu'orthogonale et $\mathbb{R}$ diagonale telles que $M = Q \times \Delta \times {}^tQ$.

On pose, par exemple, $\Delta = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

M et Δ sont semblables, donc vec trace, donc $tr\left(M\right) = tr\left(\Delta\right)$, donc $\lambda = 1 \neq 0^2$.

Un vecteur propre associé à $1 = 0^2$ est $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Le famille $\left(\underbrace{\frac{1}{\|\cdot\|_{\mathbb{R}^2}}}_{\in\mathbb{R}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\in\mathbb{R}^2}\right)$ est donc une famille de vecteurs propres, clairement orthonormée. Elle est donc libre, de cardinal 2, et comme $\dim\left(\mathcal{M}_{2,1}\left(\mathbb{R}\right)\right) = 2$, c'est une base orthonormée de $\mathcal{M}_{2,1}\left(\mathbb{R}\right)$.

Donc, en posant $Q = \underbrace{\frac{1}{\|\cdot\|_{\mathbb{R}^2}}}_{\in\mathbb{R}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ on a bien $^tS\,S = Q \times \begin{pmatrix} \|m_1\|^2 + \cdots + \|m_n\|^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \times {}^tQ$.

Donc

$$\boxed{Q = \underbrace{\frac{1}{\|\cdot\|_{\mathbb{R}^2}}}_{\in\mathbb{R}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ est telle que } {}^tQ\,S\,S\,Q \text{ est diagonale}}$$

c) D'après la question 5 b) on a :

$$\begin{aligned}
\left({}^tS\,S\right)^{-1} &= Q \times \begin{pmatrix} \frac{1}{\|m_1\|^2 + \cdots + \|m_n\|^2} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \times {}^tQ = \underbrace{\frac{1}{\|\cdot\|_{\mathbb{R}^2}}}_{\in\mathbb{R}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \frac{1}{\|m_1\|^2 + \cdots + \|m_n\|^2} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{\|m_1\|^2 + \cdots + \|m_n\|^2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\|m_1\|^2 + \cdots + \|m_n\|^2} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\left({}^tS\,S\right)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\|m_1\|^2 + \cdots + \|m_n\|^2} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}$$

d) On reprend les notations de la question 4, et on note P la matrice de p p dans la base $\mathcal{B}$.

On a donc

$$\begin{aligned}
P\,X &= X\left({}^tS\,S\right)^{-1}\,{}^tS\,S \\
&= \begin{pmatrix} m_1 & \cdots & m_n \\ \vdots & & \vdots \\ m_1 & \cdots & m_n \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \frac{1}{\|m_1\|^2 + \cdots + \|m_n\|^2} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} m_1 & m_{k_1} \\ \vdots & \vdots \\ m_n & m_{k_n} \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{\|m_1\|^2 + \cdots + \|m_n\|^2} \begin{pmatrix} m_1\,(m_1 + \cdots + m_n) & m_1\,(0 + \cdots + 0) \\ \vdots & \vdots \\ m_1\,(m_1 + \cdots + m_n) & m_1\,(0 + \cdots + 0) \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} m_1 & m_{k_1} \\ \vdots & \vdots \\ m_n & m_{k_n} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Donc $P\,X = \begin{pmatrix} \frac{\|\cdot\|_{\mathbb{R}^2}}{\|\cdot\|_{\mathbb{R}^2}} \\ \vdots \\ \frac{\|\cdot\|_{\mathbb{R}^2}}{\|\cdot\|_{\mathbb{R}^2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_n \end{pmatrix}$ donc

$$\boxed{p_F\left(x\right) = \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\|\cdot\|_{\mathbb{R}^2}}, \ldots, \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\|\cdot\|_{\mathbb{R}^2}}\right)}$$

... et on retrouve la formule du cours, car $F = \mathrm{vect}\left(\mathbb{1}_n\right)$ n $\mathrm{vect}\left(\mathbb{1}_n\right)$ (antiquar $(x_1, \ldots, x_n)$ est libre et $x_i \neq 0$.

COURS PARTICULIERS

Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs professeurs particuliers.

PLUS BULLES VA TRAVAILLER

Je trouve des cours particuliers

Note Google/Avis ★★★★★ 4.7/5

Partie III : densité et gaussienne centrée

15 ▶ Soit $i \in [\![1, n]\!]$. $X_i \hookrightarrow \mathcal{N}\left(m, \sigma^2\right)$, donc $\frac{X_i - m}{\sigma} \hookrightarrow \mathcal{N}\left(0, 1\right)$.

▶ Soit Z une variable aléatoire qui suit la loi $\mathcal{N}\left(0, 1\right)$. On note Φ la fonction de répartition et $\varphi : t \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,e^{-\frac{t^2}{2}}$ sa densité usuelle.

On note $T = \frac{Z}{\sigma}$.

Pour $t \in \mathbb{R}$, $\mathrm{dens}_{\mathbb{R}}$ pour $t \in \mathbb{R}^*$, $F_T\left(t\right) = 0$.

Pour $t \in \mathbb{R}$, $F_T\left(t\right) = P\left(T \leq t\right) = P\left(Z \leq t\,\sqrt{2}\right)$

$= P\left(-\sqrt{2}\,t \leq Z \leq \sqrt{2}\,t\right) = \Phi\left(\sqrt{2}\,t\right) - \Phi\left(-\sqrt{2}\,t\right)$.

Or Φ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.

Donc $t \mapsto \sqrt{2}\,t$ et $t \mapsto -\sqrt{2}\,t$ sont de classe C^1 sur $\mathbb{R}$, φ admet des $\mathbb{R}$, donc F_T est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^*$, F_T étant nulle sur $\mathbb{R}^*$, on a aussi F_T est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.

Enfin $\lim_{t \to +\infty} F_T\left(t\right) = 0\,F_T\left(0\right) = 0$ et $\lim_{t \to -\infty} F_T\left(t\right) = \lim_{t \to -\infty} \left(\Phi\left(\sqrt{2}\,t\right) - \Phi\left(-\sqrt{2}\,t\right)\right) = 0$ car Φ est continue en 0 et $\sqrt{2}\,t$ tend vers 0 quand t tend vers 0^-, donc F_T est continue en 0.

F_T est donc continue sur $\mathbb{R}$ et de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ sauf en 0, donc

$$\boxed{T \text{ est une variable à densité.}}$$

On obtient une densité de T en dérivant F_T sur $\mathbb{R}$ t en dérivant une valeur arbitraire positive $t \in \mathbb{R}$:

Pour $t \in \mathbb{R}$, t est donnée par :

$$f_T\left(t\right) = \begin{cases} \sqrt{2}\,\frac{\varphi\left(\sqrt{2}\,t\right)}{t} + \sqrt{2}\,\frac{\varphi\left(-\sqrt{2}\,t\right)}{t} = \sqrt{2}\,\frac{\varphi\left(\sqrt{2}\,t\right)}{t} & \text{si } x > 0 \\ 0 \text{ si } x \leq 0 \end{cases}$$

$$f_T\left(x\right) = \begin{cases} 2 \times \sqrt{2}\,\frac{\varphi\left(\sqrt{2}\,t\right)}{t} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}\,\frac{1}{t}\,\exp\left(-t\right) & \text{si } x > 0 \\ 0 \text{ si } x \leq 0 \end{cases} =$$

Donc $\begin{cases} \frac{1}{\sqrt{\pi}}\,\frac{1}{t}\,\exp\left(-t\right) & \text{si } x > 0 \\ 0 \text{ si } x \leq 0 \end{cases}$

Donc $f_T\left(x\right) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{\pi}}\,\frac{1}{t}\,\exp\left(-t\right) & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$

f_T étant une densité, on a $\int_{-\infty}^{+\infty} f_T\left(t\right)\,dt = 1$, donc $\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi}}\,\frac{1}{t}\,\exp\left(-t\right)\,dt = 1$.

Donc, on a $\frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\sqrt{\pi}} = 1$.

Donc $\sqrt{\pi} = \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$, et on trouve :

$$\boxed{f_T\left(x\right) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}\,\frac{1}{t}\,\exp\left(-t\right) & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}}$$

. Donc

$$\boxed{T \text{ suit la loi } \gamma\left(\frac{1}{2}\right).}$$

▶ On note, pour $i \in \mathcal{I} \times \mathcal{K}$, $Y = \left(\frac{X_i - m}{\sigma}\right)^2$. Comme $\frac{X_i - m}{\sigma} \hookrightarrow \mathcal{N}\left(0, 1\right)$ on vient de prouver que $Y \hookrightarrow \gamma\left(\frac{1}{2}\right)$ pour le point précédent.

Les variables Y_i, $1 \leq i \leq n$ sont indépendantes (par le lemme des coalitions car les X_i, $1 \leq i \leq n$ le sont), et toutes de loi $\gamma\left(\frac{1}{2}\right)$.

Donc, par stabilité de la loi γ, $\sum_{i=1}^n Y_i$ suit la loi $\gamma\left(\frac{n}{2}\right)$, donc

$$\boxed{\gamma\left(\frac{n}{2}, \left(\frac{\sigma}{\sigma}\right)^2 \hookrightarrow \gamma\left(\frac{n}{2}\right)}$$

donc

$$\boxed{\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - m}{\sigma}\right)^2 \hookrightarrow \chi^2\left(n\right)}$$

15 ▶ On pose $M = \left(m_{i,j}\right)_{1 \leq i,j \leq n}$.

Et $= MM$, donc pour $i \in [\![1, n]\!]$, $M_i = \sum_{j=1}^n m_{i,j}\,E_j$.

$\left(E_1, \ldots, E_n\right)$ est un vecteur gaussien, donc par définition, pour $i \in [\![1, n]\!]$, M_i est une variable gaussienne centrée.

Soit alors $\alpha = \left(\alpha_1, \ldots, \alpha_n\right)$ dans $\mathbb{R}^n$.

$\sum_{i=1}^n \alpha_i\,M_i = \sum_{i=1}^n \left(\alpha_i \sum_{j=1}^n m_{i,j}\,E_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i\,m_{i,j}\,E_j = \sum_{j=1}^n \left(\underbrace{\sum_{i=1}^n \alpha_i\,m_{i,j}}_{\text{cste}}\right)\,E_j$.

$\left(E_1, \ldots, E_n\right)$ est un vecteur gaussien, donc par définition, $\sum_{i=1}^n \alpha_i\,M_i$ est une variable gaussienne centrée.

Donc

$$\boxed{\left(M_1, \ldots, M_n\right) \text{ est un vecteur gaussien.}}$$

▶ Pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, E_i admet un moment d'ordre 2, donc d'après le cours,

$$\boxed{\text{pour tout } (i, j) \in [\![1, n]\!]^2,\ G\left(E_i\right), \text{ admet une espérance.}}$$

15 ▶ Soit $n = \left(m_1, \ldots, m_n\right)$.

$\forall\, n \in \mathbb{N}$ alors $\sum_{i=1}^n \alpha_i\,G_i = \sum_{i=1}^n \alpha_i\,G_i$ est une gaussienne centrée.

On suppose $\sigma \neq 0$ pour le reste du raisonnement.

Soit $i \in [\![1, n]\!]$.

▶ soit $m_i = 0$. Alors $\alpha_i\,G_i \hookrightarrow \mathcal{N}\left(0, \sigma_i^2\right)$ (stabilité par transformation affine de la loi normale).

▶ soit $m_i = 0$. Alors $\alpha_i\,G_i$ est une variable centrée nulle.

On note $I = \{i \in [\![1, n]\!]\ /\ \alpha_i \neq 0\}$. $I \neq \varnothing$ car $\alpha \neq 0$.

Les variables $\alpha_i\,G_i$, $i \in I$ sont indépendantes et toutes de loi normale, donc, par stabilité de la loi normale, $\sum_{i \in I} \alpha_i\,G_i \hookrightarrow \mathcal{N}\left(0, \sum_{i \in I} \sigma_i^2\right)$.

Or $\sum_{i \in I} \alpha_i\,G_i = \sum_{i=1}^n \alpha_i\,G_i$ car on rajoute des variables constantes nulles et $\sum_{i \in I} \sigma_i^2 = \sum_{i=1}^n \sigma_i^2$ car on ajoute des termes nuls,

donc $\sum_{i=1}^n \alpha_i\,G_i \hookrightarrow \mathcal{N}\left(0, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2\right)$.

Donc $\sum_{i=1}^n \alpha_i\,G_i$ est une gaussienne centrée.

Donc pour tout $\alpha = \left(\alpha_1, \ldots, \alpha_n\right)$, $\sum_{i=1}^n \alpha_i\,G_i$ est une gaussienne centrée,

donc

$$\boxed{\left(G_1, G_2, \ldots, G_n\right) \text{ est un vecteur gaussien.}}$$

Soit $(i, j) \in [\![1, n]\!]^2$ avec $i \neq j$.

$E\left(G_i\,G_j\right) = E\left(G_i\right)\,E\left(G_j\right)$ car G_i et G_j sont indépendantes.

Donc $E\left(G_i\,G_j\right) = 0$ car $E\left(G_i\right) = 0$.

Soit $i \in [\![1, n]\!]$. Alors $E\left(G_i^2\right)_i = E\left(G_i^2\right) = \underbrace{\frac{V\left(G_i\right)}{\text{Koenig-Huygens}}} + \underbrace{\left(E\left(G_i\right)\right)^2}_{=0} = 1$.

Donc

$$\boxed{\forall\, i \in G_i,}$$

16 On note $Q = \mathrm{Im}\,(A)_{1 \leq i,j \leq n}$.

$B = QG$, donc par définition du produit matriciel, on a $\forall\, i \in [\![1, n]\!]$, $B_i = \sum_{j=1}^n q_{i,j}\,G_j$.

G est indépendante, donc $Q\,{}^tQ = I_n$.

▶ Soit $i \in [\![1, n]\!]$.

$\left(G_1, \ldots, G_n\right)$ est un vecteur gaussien d'après la question précédente.

Donc $\left(B_1, \ldots, B_n\right)$ est un vecteur gaussien d'après la question 15 a).

En prenant $\alpha = \left(0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots, 0\right)$, avec i $n^{ième}$ position, on a B_i est une gaussienne centrée.

On $Y\left(B_i\right) = Y\left(\sum_{j=1}^n q_{i,j}\,G_j\right) = \sum_{j=1}^n \left(q_{i,j}\right)^2 \underbrace{V\left(G_j\right)}_{=1}$ car $\left(G_1, \ldots, G_n\right)$ est indépendante.

Donc $Y\left(B_i\right) = \sum_{j=1}^n \left(q_{i,j}\right)^2 = \sum_{j=1}^n q_{i,j} \times q_{i,j} = \mathrm{Tr}$ car on reconnaît un terme diagonal de $Q\,{}^tQ = I_n$.

Donc

$$\boxed{B_i \hookrightarrow \mathcal{N}\left(0, 1\right).}$$

▶ Soit $(i, j) \in [\![1, n]\!]^2$.

$E\left(B_i B_j\right) = E\left(\left(\sum_{k=1}^n q_{i,k}\,G_k\right)\left(\sum_{k=1}^n q_{j,k}\,G_k\right)\right)$

$= E\left(\sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n q_{i,k}\,q_{j,l}\,G_k\,G_l\right)$

$= \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n q_{i,k}\,q_{j,l}\,E\left(G_k G_l\right)$ par linéarité de l'espérance

$= \sum_{k=1}^n q_{i,k}\,q_{j,k}\,\underbrace{E\left(G_k^2\right)}_{=1}$ $\sum_{l \neq k} q_{i,k}\,q_{j,l}\,\underbrace{E\left(G_k G_l\right)}_{=0}$ d'après 15

$= \sum_{k=1}^n q_{i,k}\,q_{j,k}$

$= \sum_{k=1}^n q_{i,k}\,q_{k,j}$

On reconnaît la terme général de $Q\,{}^tQ$.

Donc $S\left(B\right) = Q\,{}^tQ = I_n$ car Q est une matrice orthogonale.

Donc

$$\boxed{S\left(B\right) = S\left(G\right).}$$

Donc pour tout $\left(\alpha_1, \ldots, \alpha_n\right) \in \mathbb{R}^n$,

$P\left(\bigcap_{i=1}^n \left(B_i \leq \alpha_i\right)\right) = P\left(\bigcap_{i=1}^n \left(G_i \leq \alpha_i\right)\right)$

$= \prod_{i=1}^n P\left(B_i \leq \alpha_i\right)$ par indépendance des G_i, $0 \leq i \leq n$

$= \prod_{i=1}^n P\left(B_i \leq \alpha_i\right)$ car B_i et G_i ont même loi $\mathcal{N}\left(0, 1\right)$.

Donc

$$\boxed{\text{les variables } B_1, B_2, \ldots, B_n \text{ sont mutuellement indépendantes.}}$$

15 ▶ $\sum_{i=1}^n P_i = I_n$ car $\sum_{i=1}^n \alpha = \alpha$ donc d'après la question 3 c), $P_1, P_2, \ldots, P_n$ sont des matrices de projection reels respectivement $p_1, p_2, \ldots, p_n$.

De plus, $P_i^2 = \mathrm{mat}_{\mathcal{B}}\left(p_i\right), \ldots, P_i = \mathrm{mat}_{\mathcal{B}}\left(p_i\right)$ sont symétriques réelles et P est une base orthonormée, donc d'après la question 4 a),

$$\boxed{P_1, \ldots, P_n \text{ sont des matrices de projections orthogonales.}}$$

Soit $(i, j) \in [\![1, n]\!]^2$ avec $i \neq j$.

Soit x, $y \in \mathrm{Im}\,(p_i) \subset \mathrm{Im}\,(p_j)$.

$\langle x, y \rangle = \langle p_i\,(x), y \rangle$ car $\mathrm{Im}\,(p_i) = \mathrm{ker}\,(p_i - I d_E)$ $\mathrm{ker}\,(p_i - I d_E) = \mathrm{ker}\,(p_j - I d_E)$.

Donc $\langle x, y \rangle = \langle x, p_j\,(y) \rangle$ car p_i et p_j sont des projections orthogonales.

Or $p_i \circ p_j = 0_{\mathcal{L}(E)}$ d'après la question 3 c) puisque $i \neq j$ donc $\langle x, y \rangle = 0$.

Donc

$$\boxed{\mathrm{Im}\,(p_i) \perp \mathrm{Im}\,(p_j) \text{ sont orthogonaux.}}$$

16 ▶ D'après la question 3 ce a) $\sum_{i=1}^n \mathrm{Im}\,(p_i)$.

On note, pour $i \in [\![1, k]\!]$, $\mathcal{B}_i'$ une base orthonormée de $\mathrm{Im}\,(p_i)$, et $\mathcal{B}'$ la concaténation des $\mathcal{B}_i'$, $1 \leq i \leq k$. $\mathcal{B}'$ est donc une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$.

On note Q la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$. Q est la matrice de passage d'une base orthonormée à une base orthonormée, c'est donc une matrice orthogonale.

On note pour $i \in [\![1, k]\!]$, $\Delta_i = \mathrm{Diag}\,(0, \ldots, 0, 1, \ldots, 1)$ $\mathrm{Diag}\,(0, \ldots, 0, 1, \ldots, 1)$.

Pour $i \in [\![1, k]\!]$, p_i est le projecteur orthogonal sur $\mathrm{Im}\,(p_i)$. Dans les vecteurs de $\mathcal{B}'$, son image eux mêmes car ils sont dans $\mathrm{Im}\,(p_i)$ et les vecteurs de $\mathcal{B}'$, sont dans $\mathrm{Im}\,(p_i)^\perp$ d'après la question précédente, donc leur $\mathrm{Im}\,(p_i)$.

Donc pour $i \in [\![1, k]\!]$, $\Delta_i = \mathrm{Diag}\,\left(\begin{array}{cccccc} 0_{\dim(\mathcal{B}_1)} & \cdots & 0_{\dim(\mathcal{B}_{i-1})} & 1_{\dim(\mathcal{B}_i)} & \cdots & 1_{\dim(\mathcal{B}_k)} \end{array}\right)$

$$\boxed{\text{Il existe } Q \text{ orthogonale telle que pour tout } i \in [\![1, k]\!],\ Q\,D_i\,{}^tQ \text{ est diagonale}}$$

17 On suppose que $r_1 \neq 0$ $\forall\, G\,D_i\,{}^tG = {}^tG\,Q\,\Delta_i\,Q\,{}^tG = {}^tQ\,\Delta_i\,Q$.

$\left(G_1, \ldots, G_n\right)$ est un vecteur gaussien et toutes les variables aléatoires G_i sont mutuellement indépendantes et toutes de loi $\mathcal{N}\left(0, 1\right)$, donc d'après la question 12 a), on montre que $G_1, \ldots, G_n$ suivent toutes la $\mathcal{N}\left(0, 1\right)$.

On pose $M = {}^tQ\,G$.

Q est une matrice orthogonale, et $G_1, G_2, \ldots, G_n$ sont mutuellement indépendantes et toutes de loi $\mathcal{N}\left(0, 1\right)$, donc d'après la question 12 b), $M_1, \ldots, M_n$ sont mutuellement indépendantes et toutes de loi $\mathcal{N}\left(0, 1\right)$.

De plus, ${}^tQ\,D_i\,{}^tQ = {}^tQ\,G = \sum_{k=1}^n M_k^2$ et les variables aléatoires $M_1, \ldots, M_n$ sont mutuellement indépendantes et toutes de loi $\mathcal{N}\left(0, 1\right)$, donc, d'après la question 15 aec, $\sum_{k=1}^n M_k^2 \hookrightarrow \chi^2\left(n\right)$. Donc

$$\boxed{\forall\, i \in G\,D_i\,{}^tG}$$

d) Avec les mêmes notations qu'au a), on a

$\forall\, i\ D_i\,G = \sum_{k=1}^n M_k^2$, $\forall\, i\ D_i\,G = \sum_{k=1}^n M_k^2$, $\ldots$, $\forall\, i\ D_i\,G = \sum_{k=1}^n M_k^2$.

Or les variables $M_1, M_2, \ldots, M_n$ sont mutuellement indépendantes, donc par le lemme des coalitions,

$$\boxed{\left(G\,D_1\,G, G\,D_2\,G, \ldots, G\,D_k\,G\right) \text{ sont mutuellement indépendantes.}}$$

Copyright © GROUPE REUSSITE - Mentions légales

groupe reussite is sort-marque A.R.L au capital de 5.000 euros RCS siège sur Google Partner